

الفاسوبر 10% اي سي

شكل المبيد وتركيبه:

مبيد حشري زراعي يحتوي على 10% (و/ح) الفاسايبيرمثرين على هيئة مركز قابل للاستحلاب .

طريقة التأثير:

مبيد حشري غير جهازى يعمل بالملامسة والتسمم المعدي.

خصائص المبيد:

الفاسوبر: من المبيدات التي تنتمي إلى الجيل الثالث من مجموعة البيروثروبيدز المصنعة المعدة حيث يظهر فعالية عالية جداً على مجال واسع من الحشرات الماصة والقارضة.
الفاسوبر: يستخدم على بعض اشجار الفاكهة و الخضراوات وغيرها من المحاصيل الزراعية.
الفاسوبر: يخلط المبيد مع العديد من المبيدات الحشرية والفطرية ومبيدات العناكب, ولا يخلط مع المبيدات ذات التأثير القلوي.
الفاسوبر: غير سام للنبات حسب النسب الموصى بها.
الفاسوبر: سام اذا ابتلع أو استنشق أو دخل مجرى التنفس، قد يسبب حساسية للجلد وللجهاز التنفسي، قابل للإشتعال، قد يسبب دوخة وغثيان، سام جدا للأحياء المائية والنحل.

نسب الاستخدام:

الفترة بين الرش والأخرى	عدد مرات الرش	فترة الأمان	نسبة الاستعمال	الأفة	المحصول
3-4 أسابيع	2	14 يوم	3-6 مل/20 لتر ماء	ديدان الثمار، المن، الخنافس	العنب، التفاح، النكتارين، اجاص، دراق، خوخ
7-10 أيام	في حال كانت الإصابة شديدة جدا بعد الرش مع الانتباه للفترة بين الرش والأخرى	7 ايام من تاريخ آخر رشه	3-6 مل/20 لتر ماء	الديدان القارضة، الذبابة البيضاء، الخنافس، التريس.	البندورة، البطاطا، الخس، الفاصولياء، الملفوف والزهرة.
14 يوم	5	7 أيام من تاريخ آخر رشه	6-10 مل/20 لتر ماء	الديدان القارضة، المن.	الحبوب، الذرة، البرسيم.
----	----	---	6-10 مل/20 لتر ماء	العث، الخنافس.	نباتات الزينة وأشجار الغابات.