

ناروكس اي سي

شكل المبيد وتركيبه:

مبيد عشبي يحتوي على 915 غ/لتر اس - متيالاكلور على هيئة مركز قابل للاستحلاب.

طريقة التأثير:

مبيد أعشاب اختياري يقاوم أعشاب رفيعة الأوراق وأعشاب عريضة الأوراق أثناء إنباتها و عشبة السعيدة.

خصائص المبيد:

ناروكس: مبيد أعشاب اختياري يقاوم أعشاب رفيعة الأوراق وأعشاب عريضة الأوراق أثناء إنباتها و عشبة السعيدة. و يمكن إستخدام المبيد قبل الزراعة ، ورشه على سطح التربة وخطه إما بالحرارة أو باستخدام مياه الري وكذلك يمكن رش المبيد بعد زراعة المحصول وقبل إنبات الأعشاب .
ناروكس: كما يمكن إستخدامه بعد الإنبات وفي هذه الحالة وللحصول على نتائج جيدة لمقاومة الأعشاب يضاف لها مواد ناشرة ومنتشطة Adjuvant.

ناروكس: قابل للخلط مع المبيدات العشبية الأخرى وينصح عمل تجربته مصغره قبل تعميم الخط.
ناروكس : قد يسبب حساسية للجلد ،سام جدا للأحياء المائية.

نسب الاستخدام:

المحصول	وقت الرش	الاعشاب	نسب الاستخدام / هكتار	ملحوظات
الذره	*قبل الزراعة لغايه 30 يوم رشا على السطح أو الخلط بالتربه *بعد الزراعة و قبل الانبات * بعد الانبات ويكون نبات الذره ورقتين عند رش المبيد بعد ظهور الأعشاب يمكن أن يضاف ماده منشطه adjuvant لزيادة فعالية المبيد..	أعشاب نجيليه حوليه وبعض عريضه الأوراق السعيد	1.75-1.25 لتر	يستخدم بعد انبات الذره في طور أقل من 6 ورقات والاعشاب في طور ورقتين
الفاصوليا	يرش قبل زراعة المحصول وفي حال ظهرت الأعشاب على سطح التربه ويضاف للمبيد ماده منشطه adjuvant (NIS) ويمكن رشه بعد الزراعة وقبل انبات المحصول	الأعشاب رفيعة الأوراق والسعيد وبعض عريضه الأوراق	1.75-1.5 لتر	-لا يرش على المحصول النامي فوق سطح التربه -يرش مرة بالعام
بازيلاء	قبل زراعة المحصول	أعشاب نجيليه حوليه وعريضة الأوراق	1.75-1.25 لتر	
البطاطا	قبل الزراعة بالرش على السطح وخطه بالتربه أو قبل انبات المحصول وظهوره على سطح التربه	السعيد، أعشاب نجيليه حوليه وعريضه الأوراق	1.75-1.25 لتر	لا يرش على المحصول النامي فوق سطح التربه
الشمندر، الشمندر الأحمر	بعد نمو المحصول ولغاية ظهور 4 ورقات للمحصول على أن يكون ذلك قبل ظهور بادرات الأعشاب على سطح التربة	الأعشاب رفيعة الأوراق والسعيد وبعض عريضه الأوراق	1.75-1.25 لتر	يستخدم بعد الانبات حتى ظهور 4 ورقات من المحصول وقبل انبات الأعشاب. *يستخدم فقط قبل الزراعة أو قبل أنبات الشمندر الأحمر
البندوره	قبل الزراعة و خلط المبيد في التربه ميكانيكيا أو بمياه الري	السعيد، أعشاب نجيليه حوليه وعريضه الأوراق	1.75-1.25 لتر	لا يستخدم المبيد على البندوره المزوعه بنور في الارض الدائم
الباذنجان	بعد زراعة الأشتال خلال 48 ساعه وقبل ظهور بادرات الاعشاب	السعيد، أعشاب نجيليه حوليه وبعض عريضة الأوراق	1.15-1.25 لتر	لا يستخدم المبيد على الأعشاب الناميه

الفلفل	بعد زراعته الأشتال وخلال يومين وقبل ظهور الأعشاب	السعيد، أعشاب نجيلية حوليه وبعض عريضه الأوراق	1.15-1.25 لتر
الترمس	عند الزراعة قبل انبات المحصول	أعشاب نجيلية حوليه وبعض عريضه الأوراق و السعيد	1.1-1.75 لتر
الفجل	قبل الزراعة او قبل الإنبات للمحصول وللأعشاب	أعشاب نجيلية حوليه وبعض عريضه الأوراق السعيد	1.5-1.2 لتر
الجزر	قبل الانبات (بعد الزراعة وقبل ظهور الأعشاب والمحصول). بعد الانبات (عند ظهور 3-5 ورقات للأعشاب وورقتين من المحصول)	أعشاب نجيلية حوليه وبعض عريضه الأوراق السعيد	1.75-1.25 لتر
الدراق،النكتارين،المشمش،التفاح،الإجاص،الخوخ،كرز،الري	قبل ظهور الأعشاب على سطح التربه وأثناء إنبات الأعشاب ، يخلط بالتربه بالحراثه أو بواسطة مياه الري	أعشاب نجيلية حوليه وبعض عريضه الأوراق السعيد	1.75-1.25 لتر
الفراوله	قبل الزراعة و قبل انبات الاعشاب وبعد نقل الأشتال الى الارض الدائمه.	أعشاب نجيلية حوليه وبعض عريضه الأوراق السعيد	1.75-1.25 لتر
البروكلي والملفوف والزهره	بعد زراعته الأشتال خلال يومين وقبل ظهور الأعشاب	أعشاب نجيلية حوليه وبعض عريضه الأوراق السعيد	1.75-1.25 لتر
القرع،الكو،ساء،الخيار،البطيخ،الشمام	قبل نقل الأشتال للأرض الدائمه أو بعد نقلها للأرض الدائمه خلال 48 ساعه. للذور : قبل إنبات المحصول أو عند ظهور المحصول بمرحله 1-2 ورقه وقبل إنبات الأعشاب	أعشاب نجيلية حوليه وبعض عريضه الأوراق السعيد	1.56-1.15 لتر
الكرفس	قبل الزراعة أو بعد نقل الأشتال وقبل إنبات بادرات الأعشاب	أعشاب نجيلية حوليه وبعض عريضه الأوراق السعيد	1.5-1.2 لتر