

# تايجر 10 اي سي

## شكل المبيد وتركيبه:

مبيد اعشاب يحتوي على 10% (و/ح) كويزالفوب-بي-ايتل على هيئة مركز قابل للاستحلاب.

## طريقة التأثير:

مبيد عشبي جهازى غير اختياري، يُمتص من خلال اوراق النبات، سريع التنقل داخل انسجة النبات.

## خصائص المبيد:

**تايجر 10 اي سي** : مبيد عشبي جهازى يمتص عن طريق سطح الأوراق وينتقل من خلال جميع الأوعيه الخشبية.

**تايجر 10 اي سي**: يكافح الأعشاب النجيلية الحولية والمعمرة بعد الإنبات في محاصيل عريضة الأوراق.

**تايجر 10 اي سي**: قابل للخلط مع مبيدات اعشاب عريضة الأوراق بعد الإنبات، وينصح بعمل تجربة خلط مبدئية قبل الخلط.

**تايجر 10 اي سي**: ضار اذا لامس الجلد أو استنشقه، يسبب حساسية للجلد ، قابل للإشتعال ،سام للأحياء المائية.

## نسب الاستخدام:

المحصول	الأعشاب	مرحلة مكافحة الأعشاب	معدل الاستعمال /دونم	فترة الأمان	ملاحظات
الشمندر، الملفوف، الجزر، الزهرة، الحمص، البرسيم، الخيار، الفول، البازيلاء، البطيخ، العدس، البصل، البطاطا، اليقطين، الفجل، البندورة، فول الصويا، دوار الشمس	الأعشاب النجيلية الحولية، شويعة (زوان)	عندما تكون الأعشاب في مرحلة 3 ورقات الى بداية مرحلة الأشطاء	25-35 مل	14 يوم 9 أسابيع 10 أسابيع 14 أسبوع 12 أسبوع ----	- تستخدم في مرحلة النمو النشط للأعشاب - تستخدم نسب الاستعمال العالية عندما تكون الأعشاب كثيفة او في بداية مرحلة الأشطاء
	الشعير البري، القمح البري	عندما تكون الأعشاب في مرحلة 3 ورقات الى بداية مرحلة الأشطاء	23 مل	14 يوم 9 أسابيع 9 أسابيع 12 أسبوع 18 أسبوع	- تستخدم في مرحلة النمو النشط للأعشاب
	الشوفان البري	عندما تكون الأعشاب في مرحلة 3 ورقات الى منتصف مرحلة الأشطاء	11.5-23 مل	10 أسابيع 9 أسابيع 21 يوم 4 أسابيع 12 أسبوع 9 أسابيع	- تستخدم في مرحلة النمو النشط للأعشاب - تستخدم الجرعة الأقل عندما تكون الأعشاب قليلة أو عندما تكون الأعشاب في مرحلة 1-3 ورقات. - تستخدم نسب الاستعمال العالية عندما تكون الأعشاب كثيفة او في بداية مرحلة الأشطاء.
	النجيل	عندما تكون الأعشاب في مرحلة 2-4 ورقات	46 مل		- تستخدم في مرحلة النمو النشط للأعشاب . - يرش المبيد فقط عندما تكون عمر النجيل أقل من شهرين ونبئت البذور.
	عشبة جونسون	عندما تكون الأعشاب في مرحلة 2 ورقة الى مرحلة 3 ورقات من مرحلة الأشطاء	46-70 مل		- تستخدم في مرحلة النمو النشط للأعشاب. - تستخدم نسب الاستعمال العالية عندما تكون الأعشاب كثيفة أو في بداية مرحلة الأشطاء.