

# اسيماكتين

## شكل المبيد وتركيبه:

مبيد حشري زراعي يحتوي على 2% (و/ح) ايمامكتين بنزويث على هيئة مركز قابل للاستحلاب .

## طريقة التأثير:

مبيد حشري غير جهازى يقضى على الحشرات عن طريق الجهاز العصبي حيث يسبب توقفها عن التغذية مما يؤدي الى حدوث شللها، وموتها .

## خصائص المبيد:

اسيماكتين 2 اي سي: يعمل على مكافحة الحشرات الضارة بالزراعة كما هو وراى بالجدول .  
 اسيماكتين 2 اي سي: قابل للخلط مع معظم المبيدات الحشرية والفطرية ولكن الأفضل عمل تجربة قبل الخلط.  
 اسيماكتين 2 اي سي: غير سام للنبات حسب النسب الموصى بها.  
 اسيماكتين 2 اي سي: ضار إذا ابتلع أو استنشق أو لامس الجلد، يسبب حساسية للجلد والعيون، قابل للاشتعال، سام للأحياء المائية، سام جدا للنحل.

## نسب الاستخدام:

المحصول	الآفة	معدل الاستعمال/20 لتر ماء	فترة الأمان
بندورة، بادنجان	الحلم، صناعات الأنفاق.	9-5 مل	10 أيام
البطاطا	الحلم، صناعات الأنفاق.		10 أيام
الملفوف، الزهرة، البروكلي	عثة الظهر الماسي، دودة الشمندر، دودة الملفوف، لفافات أوراق الملفوف، فراشة الملفوف.		14 يوم
الاجاص، الخوخ، الكرز	صناعات الأنفاق، الحلم، عثة الثمار.		14 يوم