

## سمباز 20% اي سي

### شكل المبيد وتركيبه:

مبيد حشري زراعي يحتوي على 20 % (و/ح) سايبيرمثرين على هيئة مركز قابل للاستحلاب .

### طريقة التأثير:

مبيد حشري غير جهازي يعمل بالملامسة والتسمم المعدي، له اثر متبقي طويل الامد.

### خصائص المبيد:

- سمباز 20:** مبيد حشري عام من مجموعة مركبات البيروثرويدز فعال ضد مجموعة واسعة من الحشرات التي تهاجم المحاصيل الزراعية مثل: الديدان، المن، نطاطات الاوراق وغيرها من الحشرات.
- سمباز 20:** يستخدم على اشجار الفاكهة، الخضراوات وغيرها من المحاصيل الزراعية.
- سمباز 20:** يخلط المبيد مع الكثير من المبيدات الحشرية والفطرية المعروفة والتي ليس لها تأثير قلوي، على أنه ينصح بعمل تجربة مصغرة قبل تعميم الرش.
- سمباز 20:** غير سام للنبات حسب النسب الموصى بها.
- سمباز 20:** قاتل اذا ابتلع أو دخل مجرى التنفس، ضار اذا استنشق ، قد يسبب الحساسية للجلد، قد يسبب دوخة وغثيان ، سام جدا للأحياء المائية وللنحل.

### نسب الاستخدام:

المحصول	الآفة	معدل الاستعمال لكل 20 لتر ماء	فترة الأمان	ملاحظات
الدراق والكتارين	الخنافس ، العث ، البق، الديدان	4-6 مل	14 يوم	---
التفاح والإجاص	الخنافس ،بسيلا الإجاص ، ديدان الثمار، العث، صانعات الأنفاق ، البق، نطاطات الأوراق	4-6 مل	14 يوم	----
العنب (غير الحامل)	عثة هريان العنب	4-6 مل	14 يوم	----
الحمضيات	صانعات الأنفاق	4-6 مل	14 يوم	----
البندورة، البطاطا، الفاصولياء، الزهرة، الملفوف، البصل.	المن، التريس، الديدان حرشفية الأجنحة، الذبابة البيضاء، الخنافس، البق، نطاطات الأوراق	5-6 مل	14 يوم	التطبيق الثاني حسب شدة الإصابة ويجب أن تكون الفترة بين الرشة والأخرى: البندورة الملفوف، الزهره 14-10 يوم
المحاصيل الحقلية : كالحبوب، الذرة، البرسيم	المن، الديدان القارضة، نطاطات الأوراق	3-6 مل	14 يوم	التطبيق الثاني قبل ظهور الخيوط الحريرية (silking stage) ويجب أن تكون الفترة بين الرشة والأخرى: الذرة 8-5 أيام
نباتات الزينة	المن، صانعات الأنفاق، العث	5-6 مل	—	