

سوبرا

شكل المبيد وتركيبه:

مبيد حشري يحتوي على 40 % (و/ح) ميثداثيون على هيئة مركز قابل للاستحلاب .

طريقة التأثير:

مبيد حشري غير جهازى يعمل بالملامسة والتسمم المعدي.

خصائص المبيد:

سوبرا 40 : مبيد حشري غير جهازى ينتمي الى مجموعة الفسفور العضوية حيث يقضى على مجموعة كبيرة من الحشرات الماصة والقارضة وخاصة الحشرات القشرية.

سوبرا 40: يستخدم على اشجار التفاحيات, اللوزيات, الحمضيات والمحاصيل الحقلية.

سوبرا 40: يمتاز بانه لا يتأثر بالحرارة لذا يمكن استعماله في اي وقت من اوقات السنة.

سوبرا 40: يخلط المبيد مع غيره من المبيدات الزراعية التقليدية المعروفة ولكنه لا يخلط مع المبيدات ذات التأثير القلوي.

سوبرا 40: غير سام للنبات حسب النسب الموصى بها.

سوبرا 40: سام اذا ابتلع أو استنشق ، قد يكون قاتل اذا ابتلع أو دخل مجرى التنفس ، قابل للاشتعال ، يسبب حساسية للجلد وللعيون ، قد يسبب دوخة وغثيان، سام جدا للأحياء المائية والنحل.

نسب الاستخدام:

| المحصول | الآفة | معدل الاستعمال | فترة الامان |
|---|---|--|-------------|
| التين | الحشرات القشرية، جرب التين. | 15-20مل/20لتر ماء . | 20 يوم |
| التفاح الاجاص | العنث، صانعات الأنفاق، المن، الحشرات القشرية، النطاطات، المن القطني، السوس. | 30مل عند الاصابة الشديدة | |
| اللوز، المشمش، الدراق الخوخ، النكتارين | العنث، المن، ذبابة الفاكهة. | 15-20 مل / 20 لتر ماء . 30مل عند الاصابة الشديدة. يستعمل في فترة السكون فقط. | 20 يوم |
| الليمون، البرتقال، البوملي الجريب فروت، المندلينا | الحشرات القشرية، الذبابة البيضاء، المن، صانعات الانفاق، ذبابة الفاكهة من القطن الاخضر | 30مل/20لتر ماء | 21يوم |
| القمح، الشعير | يرقات حرشفية الاجنحة | 150-250 مل / دونم | 21يوم |