

اسيكوب 85 قابل للبلل

شكل المبيد وتركيبه:

مبيد فطري يحتوي على 85 % (و/و) كبر اوكسي كلورايد على هيئة بودرة فابلة للبلل.

طريقة التأثير:

مبيد فطري وبكتيري يعمل باللامسه.

خصائص المبيد:

اسيكوب: مبيد فطري وبكتيري يعمل باللامسه، يقاوم العديد من الأمراض الفطرية والبكتيرية مثل اللفحات والبياض الزغبي والتبقع البكتيري.
اسيكوب: يستخدم على اشجار الفاكهة والخضراوات ونباتات الزينة.
اسيكوب: يخلط مع المبيدات الحشرية والفطرية والحلم ويخلط مع الأسمدة الورقية ويستعمل مباشرة بعد الخلط. لا يخلط المبيد مع الزيوت او المبيدات الحشرية التي لها تأثير حامضي ويجب الرش في الظروف الجافة وقبل تساقط الامطار.
اسيكوب: غير سام للنبات حسب النسب الموصى بها، وقد يكون له تأثير على بعض نباتات الزينة.
اسيكوب: ضار اذا ابتلع او لامس الجلد،يسبب حساسيه للجلد،سام للأحياء المائية.

نسب الاستخدام:

المحصول	المرض	نسبة الإستعمال	ملاحظات	فترة الأمان
لوز، خوخ، مشمش، كرز، دراق، نكتارين	الجرب، تجعد أوراق الدراق، الصدأ، تتقب الأوراق، العفن الأسود، العفن البني، لفحة الطرف الزهري، موت الأطراف، العفن الرمادي، البياض الزغبي، التقرح البكتيري.	200-300غم / 100 لتر ماء (40 - 70 غم / 20 لتر ماء)	رش شتوي قبل تفتح البراعم، وأثناء فترة السكون رش بعد ظهور الأعراض وبعد تفتح الأزهار 0.3كغم / 100 لتر ماء	3 أيام
التفاح والكمثرى	التقرح البكتيري	200 غم / 100 لتر ماء	رش شتوي قبل تفتح البراعم وأثناء فترة السكون	3 أيام
الحمضيات	البياض الزغبي، صدأ الأوراق، التبقع، اللفحات.	200 غم / 100 لتر ماء (40 غم / 20 لتر ماء)	رش شتوي قبل تفتح البراعم وأثناء فترة السكون	3 أيام
البنجودورة، البطاطا، الجزر والبطيخ	موت البادرات، عفن الساق، اللفحة المتأخرة، تبقع الأوراق، التبقع البكتيري، البياض الزغبي، التقرح البكتيري.	100 غم / 100 لتر ماء (20 - 25 غم / 20 لتر ماء). ملاحظة: المبيد ذو تأثير سلبي على أنواع من الجزر والبطاطا لذا يجب الحذر قبل تعميم رش المبيد.	يرش عند ظهور الأعراض ويعاد الرش بعد 7-10 أيام.	14 يوم
نباتات الزينة	البياض الزغبي، تبقع الأوراق	40 - 60 غم / 20 لتر ماء	رش شتوي قبل تفتح البراعم وأثناء فترة السكون	-----