

# روبين 25%

## شكل المبيد وتركيبه:

مبيد فطري يحتوي على 25 % (و/ح) بايراكلوستروبين على هيئة مركز قابل للإستحلاب.

## طريقة التأثير:

مبيد فطري وقائي وعلاجي، يخترق أنسجة الورقة عن طريق خاصية النفاذية.

## خصائص المبيد:

**روبين:** مبيد فطري وقائي وعلاجي، يخترق أنسجة الورقة عن طريق خاصية النفاذية، يستخدم لمكافحة الفطريات الضارة بالمحاصيل الزراعية منها الأنثراكنوز، تتبّع الأوراق، البياض الدقيقي وغيرها .

**روبين:** يمتص داخل النبات ويمتاز بخاصية النقل الى السطح الأخر من ورقة النبات المرشوش ويساعد على إخصار النبات وتحمل الظروف غير الطبيعيه .

**روبين:** يمكن استخدامه سقياً (بطاطا): يخلط المبيد بنسبة 400-800 مل من المبيد مع 100 لتر ماء /هكتار ، ويرش في خطوط المسافة بين الخط والخط 1م .

**روبين:** لا يخلط مع المواد ذات القلوبه العاليه والمواد ذات الحموضه العاليه وكذلك مع حمض الكبريتيك وحمض الفسفوريك.

**روبين:** يسبب ضرر للعيون، قد يكون قاتل اذا ابتلع او دخل مجرى التنفس، يسبب حساسية للجلد، ضار اذا استنشق أو لامس الجلد، سام اذا استنشق، قد يسبب حساسية للجهاز التنفسي، سام جدا للأحياء المائية، خفيف السمية للنحل.

## نسب الاستخدام:

المحصول	المرض	معدل الاستعمال/20 لتر ماء	فترة الامان	عدد مرات الرش	الفترة بين الرش والآخرى
ليمون، جريب فروت، برتقال ، مندلينا ،كمكوات	الجرب،الفحة المبكره،الأنثراكنوز ،التبّع الأسود،العفن الرمادي ،تساقط الثمار	13-18 مل	3 أيام	2	21-10
الذره	الأنثراكنوز،تبّع الاوراق ، الصدأ	9-18 مل	7 أيام	2	14-7
الحبوب (القمح، الشعير)	صدأ الأوراق والساق،التبّع الأسود، التلطخ،البياض الدقيقي، السبثوريا، دريشيرا	9-13 مل	يرش في موعد أقصاه بداية الإزهار	2	يرش في موعد أقصاه بداية الإزهار
البازيلا، الفاصوليا	الأنثراكنوز،الفحة المبكره ،البياض الزغبي ، الصدأ،البياض الدقيقي	9-13 مل	7 أيام	2	14-7
عباد الشمس	التبّع الأسود،الفحة المبكره،البياض الزغبي ، البياض الدقيقي،الصدأ الأبيض	10-18 مل	21 يوم	2	14-7
البطاطا	تبّع الأوراق،الصدأ،البياض الدقيقي ،البياض الزغبي	10-18 مل	3 أيام	1	14-7
البرسيم	الانثراكنوز،الصدأ، تبّعات الاوراق،تلطخ الاوراق،البياض الدقيقي والبياض الزغبي	9-13 مل	14 يوم	3	14-21
الذنع	تبّعات الأوراق ، الصدأ، البياض الدقيقي	13-18 مل	14 يوم	2	7-14