

روبين

شكل المبيد وتركيبه:

مبيد فطري يحتوي على 25 % (و/ح) بايراكلوستروبين على هيئة مركز قابل للإستحلاب.

طريقة التأثير:

مبيد فطري وقائي وعلاجي، يخترق أنسجة الورقة عن طريق خاصية النفاذية.

خصائص المبيد:

روبين: مبيد فطري وقائي وعلاجي، يخترق أنسجة الورقة عن طريق خاصية النفاذية، يستخدم لمكافحة الفطريات الضارة بالمحاصيل الزراعيه منها الأنثراكنوز، تبقع الأوراق، البياض الدقيقي وغيرها.

روبين: يمتص داخل النبات ويمتاز بخاصية النقل الى السطح الأخر من ورقة النبات المرشوش ويساعد على إخصرار النبات وتحمل الظروف غير الطبيعيه.

روبين: يمكن استخدامه سقياً (بطاطا): يخلط المبيد بنسبة 400-800 مل من المبيد مع 100 لتر ماء /هكتار ، ويرش في خطوط المسافه بين الخط والخط 1 م .

روبين: لا يخلط مع المواد ذات القلوويه العاليه والمواد ذات الحموضه العاليه وكذلك مع حمض الكبريتيك وحمض الفسفوريك.

روبين: يسبب ضرر للعيون، قد يكون قاتل اذا ابتلع او دخل مجرى التنفس، يسبب حساسية للجلد، ضار اذا استنشق أو لامس الجلد، سام اذا استنشق، قد يسبب حساسية للجهاز التنفسي، سام جدا للأحياء المائية، خفيف السمية للنحل.

نسب الاستخدام:

المحصول	المرض	معدل الاستعمال/20 لتر ماء	فترة الامان	عدد مرات الرش	الفترة بين الرش والآخرى
ليمون، جريب فروت، برتقال، مندلينا، كمكوات	الجرب، اللفحه المبكره، الأنثراكنوز، التبقع الأسود، العفن الرمادي، تساقط الثمار	18-13 مل	3 أيام	2	21-10
الذره	الأنثراكنوز، تبقع الاوراق، الصدا	18-9 مل	7 أيام	2	14-7
الحبوب (القمح، الشعير)	صدا الأوراق والساق، التبقع الأسود، التلطيخ، البياض الدقيقي، السببوريا، دريشيرا	13-9 مل	يرش في موعد أقصاه بداية الإزهار	2	يرش في موعد أقصاه بداية الإزهار
البازيلا، الفاصوليا	الأنثراكنوز، اللفحه المبكره، البياض الزغبي، الصدا، البياض الدقيقي	13-9 مل	7 أيام	2	14-7
عباد الشمس	التبقع الأسود، اللفحه المبكره، البياض الزغبي، البياض الدقيقي، الصدا الأبيض	18-10 مل	21 يوم	2	14-7
البطاطا	تبقع الأوراق، الصدا، البياض الدقيقي، البياض الزغبي	18-10 مل	3 أيام	1	14-7
البرسيم	الأنثراكنوز، الصدا، تبقعات الاوراق، تلطيخ الاوراق، البياض الدقيقي والبياض الزغبي	13-9 مل	14 يوم	3	14-21
التنعم	تبقعات الأوراق، الصدا، البياض الدقيقي	18-13 مل	14 يوم	2	7-14