

أزينايم

شكل المبيد وتركيبه:

مبيد فطري يحتوي على 50 % (و/ح) فلوزينام على هيئة مركز معلق.

طريقة التأثير:

مبيد فطري وقائي محدود الجهازية، له تأثير علاجي قليل لكن ذو أثر متبقي فعال وثابت.

خصائص المبيد:

أزينايم: مبيد فطري وقائي محدود الجهازية، له تأثير علاجي قليل لكن ذو أثر متبقي فعال وثابت.
أزينايم: أزينايم مبيد فطري يؤثر على مواقع عديدة، يعمل على تأخير أو منع ظهور مقاومة الفطريات للمبيد.
أزينايم: مبيد فطري يعمل على مكافحة الأمراض الفطرية مثل اللفحات، الأعفان وغيرها على المحاصيل الواردة بالجدول.
أزينايم: قابل للخلط مع المبيدات الحشرية والفطرية لكن ينصح بعمل تجربة مصغرة قبل الخلط.
أزينايم: غير سام للنبات حسب النسب الموصى بها.
أزينايم: يسبب تهيج للجلد، يسبب ضرر للعيون، ضار اذا استنشق، سام جداً للأحياء المائية، خفيف السمية للنحل.

نسب الاستخدام:

المحصول	المرض	معدل الإستعمال / لتر ماء	فترة الامان	عدد الرشات في الموسم	الفترة بين الرشة والأخرى
الاشتال فقط : الزهرة، الملفوف، البروكلي، الكرنب، الخردل، اللفت	الجزر الصولجاني	يستخدم المبيد سقاياه بعد الزراعة بمعدل 10 مل . وتغطيس بمعدل 60 مل	50 يوم (الزهرة ، الملفوف ، البروكلي ، الكرنب ، اللفت) 20 يوم للخردل	---	---
الجزر	اللفحة، التعفن السكلوروتيني، اللفحة المبكرة	23 مل	7 أيام	4	يجب ان تكون الرشة الثانية بعد 14 يوم من الرشة الاولى . و الفترة بين باقي الرشات 7 ايام
البازلاء، الفول الفاصوليا، الترمس	العفن الأبيض ، العفن الرمادي.	12 - 21 مل	14 يوم	2	10-7 أيام
البصل	لفحة الاوراق، عفن البوترايتس، البياض الدقيقي، التبقع الارجواني	23 مل	7 أيام	6	10-7 أيام
بطاطا	اللفحة المتأخرة ، الجرب العفن الابيض، اللفحة المبكرة	9-12 مل	14 يوم	---	10-7 أيام
بندورة	البوترايتس، لفة السكلوروتينيا، اللفحة المتأخرة	16 مل	14 يوم	2	يرش في مرحلة مبكرة من الازهار والرشة الثانية بعد 14 يوم