



برنت 40 % اس سي

شكل المبيد وتركيبه:

مبيد فطري يحتوي 40% و/ح سيازوفاميد على هيئة مركز معلق.

طريقة التأثير:

برنت مبيد فطري وقائي وعلاجي .

خصائص المبيد:

برنت: مبيد فطري وقائي وعلاجي إما رشاً على الأوراق أو عن طريق الري يعمل على تثبيط كافة اطوار اللفحة المتأخرة.

برنت: قابل للخلط مع المبيدات الأخرى وينصح بعمل تجربة مصغرة قبل تعميم الخلط .

برنت: سام جداً للأحياء المائية.

نسب الاستخدام:

الفترة بين الرش والآخرى	عدد المعاملات	فترة الامان	معدل الاستخدام /20 لتر ماء	المرض	المحصول
10-7 أيام	6 مرات (1 سفاية ، 5 رش) (عدم رش أكثر من 3 رشات متتالية)	3 أيام	سقاية 20-40 مل الرش الورقي 4 مل	الجنر الصولجاني البياض الزغبي	الملفوف، الزهرة، الكرنب والبروكلي
21-14 يوم	5 مرات على المحصول الواحد	14 يوم	9 مل	التبقع، الموت الرجعي للجذور (البيثيوم)	الجزر
10-7 أيام	6 مرات على المحصول (عدم رش أكثر من 3 رشات متتالية) الخيار في البيوت البلاستيكية (4 مرات)	3 أيام	4-3 مل 4 مل	البياض الزغبي لفحة Phytophthora	الخيار، الشمام البطيخ، اليقطين، الكوسا والخيار في البيوت البلاستيكية
10-7 أيام	6 مرات على المحصول (عدم رش أكثر من 3 رشات متتالية)	3 أيام	4 مل	الصدأ الأبيض، البياض الزغبي ، سقوط البادرات (البيثيوم)	الخس، السبانخ والبقدونس
14-7 يوم	6 مرات على المحصول (عدم رش أكثر من 3 رشات متتالية)	3 أيام	4 مل	البياض الزغبي لفحة Phytophthora البيثيوم	الحمص، الفول، العدس الفاصوليا واللوبياء
10-7 أيام	10 مرات (عدم رش أكثر من 3 رشات متتالية)	7 يوم	الرش الورقي 2-4 مل عند الزراعة 9 مل عند الحراثة 4 مل	اللفحة المتأخرة ،لفحة الأوراق، العفن الزهري عفن الجذور (البيثيوم)	البطاطا والبطاطا الحلوة
10-7 أيام	6 مرات على المحصول (عدم رش أكثر من 3 رشات متتالية)	3 أيام	4 مل	البياض الزغبي	البصل والثوم
10-7 أيام	6 مرات على المحصول (عدم رش أكثر من 3 رشات متتالية)	3 أيام	4-3 مل 4 مل 4 مل 5 مل	اللفحة المتأخرة، البياض الزغبي لفحة Phytophthora سقوط البادرات (Pythium) لفحة Phytophthora سقوط البادرات	الفلفل، الباذنجان، البامية، البندورة (المكشوفة وبالبيوت البلاستيكية) اشتال البندورة للبيوت البلاستيكية الفلفل بالبيوت البلاستيكية