

## مونستر 10% اف اس

### شكل المبيد وتركيبه:

مبيد فطري يحتوي على 10% و/ح فلوديكسينول على هيئة مركز انسيابي لمعاملة البذور .

### طريقة التأثير:

مبيد فطري غير جهازى ذو نشاط متبقى طويل الامد.

### خصائص المبيد:

**مونستر** : مبيد فطري غير جهازى ذو نشاط متبقى طويل الامد، يمتص في الأنسجة النباتية. خصائصه العلاجية محدودة بشكل عام، يمنع بشكل رئيسي تكون أبواغ الفطر.  
**مونستر** : يستخدم كعلاج للتقاوي والبذور للسيطرة على العفن الجاف (الفيوزاريوم) والريزوكتونيا وغيرها من الامراض الفطرية التي تصيب البطاطا و المحاصيل الاخرى الواردة بالجدول أدناه.  
**مونستر** : قابل للخلط مع المبيدات الأخرى و ينصح بعمل تجربته خلط مصغرة قبل تعميم الخلط.  
**مونستر** : يسبب تهيج للعيون، سام للأحياء المائية.

### نسب الاستخدام:

المحصول	المرض	معدل الإستعمال	ملاحظات
البروكلي	الرايزوكتونيا	50 مل / 100 كغ بذور	لا تخزن البذور المعاملة أكثر من 6 أشهر قبل زراعتها
الذرة الذرة الحلوة	سقوط البادرات (الفيوزاريوم) البنسيليوم	50 مل / 100 كغ بذور	----
تقاوي البطاطا قبل و خلال الزراعة قبل التخزين	النقطة السوداء الجرب الأسود والفضي الرايزوكتونيا العفن الجاف ( الفيوزاريوم )	250 مل / طن تقاوي	يجب التأكد من جفاف التقاوي المعاملة قبل تخزينها وقبل زراعتها