

كلوديا

شكل المبيد وتركيبه:

مبيد أعشاب يحتوي على كلودينا فوب-بروبار جيل 24% وزن/حجم + كلوكوينتوسيت ميكسيل 6% وزن/حجم في صورة مركبات قابلة للاستحلاب (EC).

طريقة التأثير:

مبيد أعشاب جهازى وانتقائى، يعمل عن طريق تثبيط تخليق الأحماض الدهنية.

خصائص المبيد:

كلوديا: مبيد أعشاب جهازى وانتقائى، يعمل عن طريق تثبيط تخليق الأحماض الدهنية.

كلوديا: يُستخدم لمكافحة الحشائش الحولية بعد إنباتها على القمح.

كلوديا: غير قابل للخلط مع المواد التالية: Diuron, Triasulfuron, bromoxynil + dicamba + MCPA, 2,4-D

كلوديا: ضار عند الاستنشاق، ضار عند البلع، ضار عند ملامسة الجلد، يسبب رد فعل تحسسي جلدي، قابل للاشتعال، قد يسبب تلفاً للأعضاء عند التعرض له لفترات طويلة أو متكررة، سام للكائنات المائية.

نسب الاستخدام:

لزيادة فعالية المبيد، يجب استخدام معدل رش زيتي قدره 200 مل لكل 20 لترًا من الماء.

المحصول	الاعشاب	نسب الاستعمال	مرحلة نمو الاعشاب	ملاحظات
القمح	الشوفان البري Wild oats	13 مل / 20 لتر ماء	من 2-5 ورقات	--
		17 مل / 20 لتر ماء	من مرحلة الورقتين الى مرحلة التفريع	إذا كانت الاعشاب غير نشطة
		25 مل / 20 لتر ماء		عند خلط المبيد مع مبيدات عريضة الاوراق
	عشبة الكناري Phalaris spp	17 مل / 20 لتر ماء	من مرحلة الورقتين الى مرحلة التفريع	مضاعفة نسب الاستخدام عند خلط المبيد مع مبيدات عريضة الاوراق
		32 مل / 20 لتر ماء	مرحلة الورقتين الى مرحلة التفريع	مضاعفة النسبة إذا كانت الاعشاب غير نشطة