

تايجر 10 اي سي

شكل المبيد وتركيبه:

مبيد اعشاب يحتوي على 10% (و/ح) كوايزالوفوب-بي-اينثل على هيئة مركز قابل للاستحلاب.

طريقة التأثير:

مبيد عشبي جهازى غير اختياري، يُمتص من خلال اوراق النبات، سريع التنقل داخل انسجة النبات.

خصائص المبيد:

تايجر 10 اي سي : مبيد عشبي جهازى يمتص عن طريق سطح الأوراق وينتقل من خلال جميع الأوعية الخشبية.

تايجر 10 اي سي: يكافح الأعشاب النجيلية الحولية والمعمرة بعد الإنبات في محاصيل عريضة الأوراق.

تايجر 10 اي سي: قابل للخلط مع مبيدات اعشاب عريضة الأوراق بعد الإنبات، وينصح بعمل تجربة خلط مبدئية قبل الخلط.

تايجر 10 اي سي: ضار اذا لامس الجلد أو استنشقه، يسبب حساسية للجلد ، قابل للإشتعال ، سام للأحياء المائية.

نسب الاستخدام:

المحصول	الأعشاب	مرحلة مكافحة الأعشاب	معدل الاستعمال /دونم	فترة الأمان	ملاحظات
الشمندر، الملفوف، الجزر، الزهرة، الحمص، البرسيم، الخيار، الفول، البازيلاء، البطيخ، العدس، البصل،	الأعشاب النجيلية الحولية، شويعة (زوان)	عندما تكون الأعشاب في مرحلة 3 ورقات الى بداية مرحلة الأشطاء	25-35 مل	14 يوم 9 أسابيع 10 أسابيع 14 أسبوع 12 أسبوع ----	- تستخدم في مرحلة النمو النشط للأعشاب - تستخدم نسب الاستعمال العالية عندما تكون الأعشاب كثيفة او في بداية مرحلة الأشطاء
البطاطا، البقطين، الفجل، البندورة، فول الصويا، دوار الشمس	الشوفان البري	عندما تكون الأعشاب في مرحلة 3 ورقات الى منتصف مرحلة الأشطاء	23 مل	14 يوم 12 أسبوع 9 أسابيع 9 أسابيع 12 أسبوع 18 أسبوع	- تستخدم في مرحلة النمو النشط للأعشاب
		عندما تكون الأعشاب في مرحلة 3 ورقات الى منتصف مرحلة الأشطاء	11.5-23 مل	10 أسابيع 9 أسابيع 21 يوم 4 أسابيع 12 أسبوع 9 أسابيع	- تستخدم الجرعة الأقل عندما تكون الأعشاب قليلة أو - عندما تكون الأعشاب في مرحلة 1-3 ورقات. - تستخدم نسب الاستعمال العالية عندما تكون الأعشاب كثيفة او في بداية مرحلة الأشطاء.

- تستخدم في مرحلة النمو النشط للأعشاب . - يرش المبيد فقط عندما تكون عمر النجيل أقل من شهرين ونبتت البذور.		46 مل	عندما تكون الأعشاب في مرحلة 2-4 ورقات	النجيل	
- تستخدم في مرحلة النمو النشط للأعشاب . - تستخدم نسب الاستعمال العالية عندما تكون الأعشاب كثيفة أو في بداية مرحلة الأشطاء.		46-70 مل	عندما تكون الأعشاب في مرحلة 2 ورقة الى مرحلة 3 ورقات من مرحلة الأشطاء	عشبة جونسون	