

كاروزن اي سي

شكل المبيد وتركيبه:

مبيد عشبي يحتوي على 24% و/ح Carfentrazone-ethy على هيئة مركز قابل للاستحلاب.

طريقة التأثير:

مبيد عشبي يمتص بواسطة الأوراق و يعمل بالملامسه وله محدودية السريان بالنبات و يعمل على تهتك أغلفة الخلايا يستخدم بعد الانبات.

خصائص المبيد:

كاروزن اي سي : مبيد عشبي يمتص بواسطة الأوراق و يعمل بالملامسه وله محدودية السريان بالنبات و يعمل على تهتك أغلفة الخلايا يستخدم بعد الانبات ، يجب ان يستخدم على الأعشاب النامية فوق سطح التربه ولن يؤثر على البذور تحت سطح التربه لمكافحة اعشاب عريضه.

كاروزن اي سي : مبيد أعشاب عريضة الأوراق بعد إنباتها لقتل بادرات الاعشاب بعد ظهورها على السطح وهي ما زالت نشطة.

كاروزن اي سي : يفضل إضافة مواد منشطه (Adjuvant) لزيادة فعالية المبيد لقتل الأعشاب مثل أمونيوم سلفيت 1-2% أو مواد خافضة للتوتر السطحي غير أيونية (Nonionic) .
surfactant

كاروزن اي سي : قابل للخلط مع معظم مبيدات الأعشاب والمواد الناشره واللاصقه على أن يتم إجراء فحص في الحقل لبيان خواص المواد المخلوطة فزيائيا بحيث لا يحدث أي تغيرات في هذه المواد.

كاروزن اي سي : قد يكون قاتل إذا ابتلع أو دخل مجرى التنفس، قابل للإشتعال، يسبب حساسيه للجلد، سام للأحياء المائية.

نسب الاستخدام:

المحصول	نسب الاستعمال /دونم	ملاحظات	فترة الأمان
الذره	15 مل	لمقاومة أعشاب عريضة الأوراق في محصول الذره الذي نبت وظهر على سطح التربه لغاية 14 ورقه	3 أيام
الشوفان، القمح، الشعير باستثناء القمح الشتوي*	4-8 مل	-يستخدم رشا على المحصول لحين مرحلة التفريع.	3 أيام
البرتقال، الليمون، الجريب فروت، المندلينا، اجاص، تفاح، سفرجل، دراق، مشمش، نكتارين، خوخ، كرز، رمان، تين، النخيل، الموز	15 مل	يستخدم لمقاومة النموات الجديده للأشجار التي تخرج من الجذر أو اسفل الساق عندما تكون suckers غصه وطريه - كذلك يستخدم لقتل الأعشاب عريضة الاوراق النامييه بين الأشجار والتي تكون ف حاله نشطه	3 أيام
العنب	15 مل	يستخدم لمقاومة النموات الجديده للأشجار التي تخرج من الجذر أو اسفل الساق وهي في أوج suckers نشاطها قبل أن تصبح خشبيه وكذلك أعشاب عريضة الأوراق النشطه	3 أيام
-الفاصوليا ، الفول الترمس ،البازيلاء ،اللوبياء، الحمص ،العدس،الخس،الجزر،الفجل، السبانخ،الكراث،الثوم،البصل، اللفت،البقدونس،بروكلي، الملفوف، الزهره،الكرفس الباذنجان،الفلفل ،البندوره ،الخيار،البطيخ،الشمام،القرع، الكوسا)	15 مل	-يستخدم لقتل الأعشاب قبل الزراعه وقبل نقل الشتال للأرض الدائمه (الزراعه بالاشتال). -يستخدم بعد زراعه المحصول وقبل إنباته (الزراعه بالبذور) -يستخدم بعد نقل الشتال الى الأرض الدائمه مع الانتباه لعدم وصول محلول الرش للمحصول.	7 أيام
البطاطا	15 مل	- قتل الاعشاب الضاره قبل الزراعه وقبل إنبات محصول البطاطا بعد الزراعه يستخدم عند الحصاد للتخلص من أوراق محصول البطاطا وتجفيفها	7 أيام