

## ناروكس

### شكل المبيد وتركيبه:

مبيد عشبي يحتوي على 915 غ/لتر اس - متيلاكlor على هيئة مركز قابل للاستحلاب.

### طريقة التأثير:

مبيد أعشاب اختياري يقاوم أعشاب رفيعة الأوراق وأعشاب عريضة الأوراق أثناء إنباتها و عشبة السعيدة.

### خصائص المبيد:

**ناروكس:** مبيد أعشاب اختياري يقاوم أعشاب رفيعة الأوراق وأعشاب عريضة الأوراق أثناء إنباتها و عشبة السعيدة. و يمكن إستخدام المبيد قبل الزراعة ، ورشه على سطح التربة و خلطه إما بالحرارة أو باستخدام مياه الري وكذلك يمكن رش المبيد بعد زراعة المحصول وقبل إنبات الأعشاب .

**ناروكس:** كما يمكن إستخدامه بعد الإنبات وفي هذه الحالة وللحصول على نتائج جيدة لمقاومة الأعشاب يضاف لها مواد ناشرة ومنشطة Adjuvant.

**ناروكس:** قابل للخلط مع المبيدات العشبية الأخرى وينصح عمل تجربته مصغره قبل تعميم الخلط.

**ناروكس :** قد يسبب حساسية للجلد ، سام جدا للأحياء المائية.

نسب الاستخدام:

| المحصول                    | وقت الرش                                                                                                                                                                                                                          | الاعشاب                                             | نسب<br>الاستخدام /<br>هكتار | ملحوظات                                                                                                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الذره                      | *قبل الزراعه لغايه 30 يوم رشا على<br>السطح أو الخلط بالتربه<br>*بعد الزراعه وقبل الانبات<br>* بعد الانبات ويكون نبات الذره ورقتين<br>عند رش المبيد بعد ظهور الأعشاب يمكن<br>أن يضاف ماده منشطه adjuvant لزيادة<br>فعالية المبيد.. | أعشاب نجيليه حوليه وبعض<br>عريضه الأوراق<br>السعيد  | -1.25<br>1.75 لتر           | يستخدم بعد انبات<br>الذره في طور أقل<br>من 6 ورقات<br>والاعشاب في طور<br>ورقتين                                                             |
| الفاصوليا                  | يرش قبل زراعه المحصول وفي حال<br>ظهرت الأعشاب على سطح التربه ويضاف<br>للمبيد ماده منشطه adjuvant<br>(NIS)<br>ويمكن رشه بعد الزراعه وقبل انبات<br>المحصول                                                                          | الأعشاب رفيعة الأوراق والسعيد<br>وبعض عريضه الأوراق | 1.75-1.5<br>لتر             | -لا يرش على<br>المحصول النامي<br>فوق سطح التربه<br>-يرش مرة بالعام                                                                          |
| بازيلاء                    | قبل زراعه المحصول                                                                                                                                                                                                                 | أعشاب نجيليه حوليه وعريضة<br>الأوراق                | -1.25<br>1.75 لتر           |                                                                                                                                             |
| البطاطا                    | قبل الزراعه بالرش على السطح وخلطه<br>بالتربه<br>أو قبل انبات المحصول وظهوره على<br>سطح التربه                                                                                                                                     | السعيد، أعشاب نجيليه حوليه<br>وعريضه الأوراق        | -1.25<br>1.75 لتر           | لا يرش على<br>المحصول النامي<br>فوق سطح التربه                                                                                              |
| الشمندر، الشمندر<br>الأحمر | بعد نمو المحصول ولغاية ظهور 4 ورقات<br>للمحصول<br>على أن يكون ذلك قبل ظهور بادرات<br>الأعشاب على سطح التربه                                                                                                                       | الأعشاب رفيعة الأوراق والسعيد<br>وبعض عريضه الأوراق | -1.25<br>1.75 لتر           | يستخدم بعد الأنبات<br>حتى ظهور 4<br>ورقات من<br>المحصول وقبل<br>إنبات الأعشاب.<br>*يستخدم فقط قبل<br>الزراعه أو قبل أنبات<br>الشمندر الأحمر |
| البندوره                   | قبل الزراعه وخلط المبيد في التربه ميكانيكيا<br>أو بمياه الري                                                                                                                                                                      | السعيد، أعشاب نجيليه حوليه<br>وعريضه الأوراق        | -1.25<br>1.75 لتر           | لا يستخدم المبيد على<br>البندوره المزروعه<br>بذور في الارض<br>الدائمه                                                                       |
| الباذنجان                  | بعد زراعه الأشتال خلال 48 ساعه وقبل<br>ظهور بادرات الاعشاب                                                                                                                                                                        | السعيد، أعشاب نجيليه حوليه<br>وبعض عريضة الأوراق    | 1.15-<br>1.25 لتر           | لا يستخدم المبيد على<br>الأعشاب الناميه                                                                                                     |
| الفلفل                     | بعد زراعه الأشتال وخلال يومين وقبل<br>ظهور الأعشاب                                                                                                                                                                                | السعيد، أعشاب نجيليه حوليه<br>وبعض عريضه الأوراق    | 1.15-<br>1.25 لتر           |                                                                                                                                             |
| الترمس                     | عند الزراعه<br>قبل انبات المحصول                                                                                                                                                                                                  | أعشاب نجيليه حوليه وبعض<br>عريضه الأوراق و السعيد   | 1.1-1.75<br>لتر             | لا يرش على<br>المحصول النامي<br>فوق سطح التربه                                                                                              |
| الفجل                      | قبل الزراعه او قبل الإنبات للمحصول<br>وللأعشاب                                                                                                                                                                                    | أعشاب نجيليه حوليه وبعض<br>عريضه الأوراق<br>السعيد  | 1.5-1.2<br>لتر              | لا يرش على<br>المحصول النامي<br>فوق سطح التربه                                                                                              |

|                                                                                                          |               |                                              |                                                                                                                                                          |                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| وكذلك للإعشاب                                                                                            |               |                                              |                                                                                                                                                          |                                                    |
| لا يرش المبيد بعد ظهور أوراق المحصول الحقيقيه (4 ورقات)                                                  | 1.25-1.75 لتر | أعشاب نجيلية حوليه وبعض عريضه الأوراق السعيد | قبل الانبات ( بعد الزراعه وقبل ظهور الأعشاب والمحصول). بعد الانبات ( عند ظهور 3-5 ورقات للأعشاب و ورقتين من المحصول)                                     | الجزر                                              |
| مع ملاحظه عدم وصول محلول الرش لأوراق النبات المرشوش أو السيقان                                           | 1.25-1.75 لتر | أعشاب نجيلية حوليه وبعض عريضه الأوراق السعيد | قبل ظهور الأعشاب على سطح التربه وأثناء إنبات الأعشاب ، يخلط بالتربه بالحراره أو بواسطه مياه الري                                                         | الدراق،النكتارين، المشمش، التفاح،الإجاص،الخوخ، كرز |
| مع ملاحظه عدم وصول محلول الرش لأوراق الفراوله                                                            | 1.25-1.75 لتر | أعشاب نجيلية حوليه وبعض عريضه الأوراق السعيد | قبل الزراعه وقبل انبات الاعشاب وبعد نقل الأشتال الى الارض الدائمه.                                                                                       | الفراوله                                           |
| ملاحظه عدم وصول محلول الرش للأوراق الخضراء للمحصول                                                       | 1.25-1.75 لتر | أعشاب نجيلية حوليه وبعض عريضه الأوراق السعيد | بعد زراعه الأشتال خلال يومين وقبل ظهور الأعشاب                                                                                                           | البروكلي والملفوف والزهره                          |
| لا يستخدم المبيد على الأعشاب الناميه فوق سطح التربه، مع ملاحظه عدم وصول محلول الرش لأوراق النبات المرشوش | 1.15-1.56 لتر | أعشاب نجيلية حوليه وبعض عريضه الأوراق السعيد | قبل نقل الأشتال للأرض الدائمه أو بعد نقلها للأرض الدائمه خلال 48 ساعه. للبدور : قبل إنبات المحصول أو عند ظهور المحصول بمرحله 1-2 ورقه وقبل إنبات الأعشاب | القرع،الكو،سا،الخيار، البطيخ،الشمام                |
| ملاحظه عدم وصول محلول الرش لأوراق النبات المرشوش                                                         | 1.2-1.5 لتر   | أعشاب نجيلية حوليه وبعض عريضه الأوراق السعيد | قبل الزراعه أو بعد نقل الأشتال وقبل إنبات بادرات الأعشاب                                                                                                 | الكرفس                                             |