

اسيكلور 50%

شكل المبيد وتركيبه:

مبيد حشري للصحة العامة يحتوي على 50 % (و/ح) كلوربيريفوس على هيئة مركز قابل للاستحلاب .

طريقة التأثير:

مبيد حشري غير جهازي يعمل بالملامسة والتسمم المعدي وتأثيره على الجهاز التنفسي.

خصائص المبيد:

اسيكلور 50: مبيد ذو فعالية عالية للحشرات الطائرة والزاحفة ذات الاهمية بالنسبة للصحة العامة .
اسيكلور 50: فعال ضد الذباب، البعوض، القراد، البراغيث، الصراصير، البق. هذا وتعتبر المادة الفعالة له المعيار العالمي في ما يخص الفعاليه على البعوض والصراصير.
اسيكلور 50: لا يخلط مع المواد القلوية.
اسيكلور 50: سام اذا ابتلع، قد يكون قاتل اذا ابتلع او دخل مجرى التنفس، قد يسبب حساسية للجهاز التنفسي، قد يسبب دوخة و غثيان، قابل للاشتعال، سام جدا للأحياء المائية، سام جدا للنحل .

نسب الاستخدام:

نوع المكافحة	نسبة الاستعمال	نسبة الرش	ملاحظات	فترة الاثر المتبقي
مكافحة الذباب والبعوض البالغ خارج البنايات	1 اسيكلور : 100 ماء	لتر واحد من المحلول المخفف لكل 15-20م ²	تستخدم مضخة ضغط منخفض لمعالجة مناطق تجمع الذباب مثل القمامه، وحواف الاسوار القريبه من الابنيه	يبقى فعالا لمدة تزيد عن 3 اسابيع اذا تم مضاعفة التركيز فان المده تزداد الى اكثر 8 اسابيع
مكافحة البعوض خارج البنايات فقط (البرقات) 1- المياه الطبيعيه غير الملوثة 2- المياه الملوثة 3- صهاريج مياه الصرف الصحي.	مسطحات المياه والمستنقعات ترش بمعدل 100 سم ³ / 10000 م ² من مسطحات المياه يضاعف التركيز اعلاه في مياه المستنقعات يضاف 50 سم ³ / صهريج حجمه 50 م ³	— —	اذا كان الماء مغطى بالنباتات تستخدم النسبه المنخفضه والنسبه العاليه عند وجود نباتات كثيفه يكون تركيز ماده الفعاله في الماء 0.1 جزء من مليون تقريبا	— —
مكافحة الحشرات الزاحفه خارج وداخل الابنيه	1 اسيكلور : 100 ماء	لتر واحد من المحلول المخفف لكل 15-20م ²	لمكافحة الصراصير، بق الفراش، النمل، القراد، البراغيث حيث ترش المناطق وخاصه الشقوق، الاراضي، الفجوات وطرق ممر الحشرات الزاحفه.	يبقى المبيد فعالا لمدة تزيد عن 3 اسابيع اذا تم مضاعفة التركيز بنسبة 2.5% فان المده تزداد لاكثر من 6 اسابيع.