

# اسيلين

## شكل المبيد وتركيبه:

مبيد حشري زراعي يحتوي على 25% (و/و) دايفلوبنزيرون على هيئة مسحوق قابل للبلل.

## طريقة التأثير:

مبيد حشري غير جهازى مثبط لنمو الحشرات يعمل بالملامسة والتسمم المعدي، وهو مانع لإنسلاخ الحشرات وتأثيره قوي على البيوض حيث يمنع تفقسها.

## خصائص المبيد:

**اسيلين 25 قابل للبلل:** يستخدم لمكافحة الحشرات الضارة بالزراعة منها حشرات آكلة الاوراق.  
**اسيلين 25 قابل للبلل:** يستخدم على اشجار التفاحيات، اللوزيات، الحمضيات وغيرها من المحاصيل الزراعية.  
**اسيلين 25 قابل للبلل:** غير قابل للخلط مع المواد ذات التأثير القلوي  
**اسيلين 25 قابل للبلل:** غير سام للنبات حسب النسب الموصى بها.  
**اسيلين 25 قابل للبلل:** ضار اذا لامس الجلد ، سام للأحياء المائية ، سام للنحل.

## نسب الاستخدام:

فترة الأمان	ملاحظات	معدل الاستعمال 20لتر/م <sup>2</sup>	الآفة	المحصول
14	الرش خلال تواجد الفراشات حتى فقس البيض ويعاد الرش مرة لكل جيل أو شهرياً.	2غم	دودة ثمار التفاح.	التفاح، الإجاص، اللوز، الخوخ، الدراق، المشمش.
	الرش قبل فقس البيض ويعاد الرش مرة لكل جيل.	8غم	صانعات الأنفاق.	
	-	8غم	ديدان إتفاف الأوراق.	
	الرش بعد الإزهار على البيوض والطور اليرقي الأول ويعاد الرش كل 3-4 أسابيع. ولزيادة فعالية المبيد يخلط مع مبيدات حشرية لمكافحة الحشرات الكاملة والأطوار اليرقية المتقدمة.	8غم+60مل زيت صيفي	بسيلا الإجاص.	
	الرش عند وضع البيض حتى بداية الفقس ويعاد الرش مرة لكل جيل.	8-16غم	ثاقبة البراعم.	
	الرش عند وضع البيض حتى بداية الفقس ولمكافحة الأجيال التالية التي تهاجم الثمار الناضجة يتم الرش قبل 4-8 أسابيع من موعد قطف الثمار.	8-16غم	دودة ثمار الدراق.	
14	الرش عند بداية ظهور تجمعات ويمكن الرش ثلاث مرات عند الحاجة بعد الإزهار وفي الصيف وفي الخريف ويكون التأثير الفوري بطيء حيث يحدث انخفاض كبير في الكثافة العددية بعد 7-14 يوم من الرش ويستمر تأثير الرش لمدة 10-13 أسبوع.	6-10غم	حلم الحمضيات الصندني.	الحمضيات.
	الرش كل أسبوع عند وضع البيض ويعاد الرش عند الحاجة.	6-10غم	ثاقبة الأوراق.	
	الرش عند فقس البيض لمكافحة اليرقات.	8-16غم	عثة الأزهار.	
-	الرش قبل الفقس لمكافحة البيض واليرقات مع مراعاة إجراء رشات متتابعة لسرعة نمو النبات ودورة الحياة القصيرة للأفات.	12-20غم	فراشة الملفوف، دودة أوراق القطن، عثة الظهر الماسي، الديدان القارضة.	الملفوف، الزهرة، الفجل.
		30-40غم	ذبابة المشروم.	المشروم.
-	الرش خلال وضع البيض وبداية تطور اليرقات.	1-2غم	ديدان الأوراق.	أشغال الأزهار.
		3-4غم	ديدان الأوراق.	أشغال أشجار الغابات ونباتات الزينة.