

بروماك - سي

شكل المبيد وتركيبه:

مبيد لمكافحة القوارض يحتوي على 0.25 % (و/و) بروماديلون على هيئة سائل مركز .

طريقة التأثير:

يعمل بروماك - سي على وقف وتثبيط عمل مادة Prothrombin التي تفرز من قبل الكبد.

خصائص المبيد:

بروماك - سي: من الجيل الثاني للمواد المانعة لتخثر الدم عند القوارض حيث يعمل على وقف وتثبيط عمل مادة Prothrombin التي تفرز من قبل الكبد والتي تعتبر جزء هام في آلية تخثر الدم في القوارض ومن ثم موتها.

بروماك - سي : لمكافحة الجرذان والفئران في المزارع وفي البيوت وفي حدائق الحيوانات وفي المذابح ومزارع الاغنام وفي البواليع وفي موانئ السفن وفي الشاحنات وفي المستودعات وفي المناطق المزدحمة بالسكان وايضاً يستخدم في مكافحة الجرذان والفئران بين المرزوعات مثل الارز والحمضيات وقصب السكر.

بروماك - سي: يكافح الجرذ البني، فئران الحقل، والجرذ الاسود في حقول الفاكهة والخضراوات، المخازن، الابنية التجارية والمناطق السكنية.

بروماك - سي: يستخدم على شكل سائل مركز او على شكل طعم جاهز .

بروماك - سي: غير سام للقطط والكلاب التي تتغذى على الفئران والجرذان المسمومة.

بروماك - سي: قاتل اذا ابتلع أو استنشق أو لامس الجلد ، يسبب ضرر للأعضاء نتيجة التعرض المستمر او لفترات طويلة ،سام جدا للأحياء المائية .

نسب الاستخدام:

الشكل	نسبة الاستخدام	الآفة
بروماك سي 0.25% سائل مركز	1 مبيد: 49 طعم جاهز او 1 مبيد: 49 ماء	القوارض تحت الظروف القاسية مثل قلة المياه وقلة الطعام الرطب يحتاج الجرذ الى الماء للشرب مما يساعد على تناول الماء المسموم للحاجة الماسة في مثل هذه الظروف
بروماك سي الطعم الجاهز	20-40 غم من الطعم توضع الطعوم على بعد لا يزيد عن 5 م اما عند الإصابة الشديدة يجب ان تكون المسافة 1-2 متر بين الطعوم	لمكافحة الجرذان والفئران مع وضع كميات كبيرة مرة واحدة في اماكن متفرقة ومراعاة حماية الطعوم من المياه او تساقط الامطار.